

SANTA MARTHA MEDICAL CLINIC

EDGARD ALFONSO ARCIA-BRAVO

677 Richmond St. Suite # 1
London, Ontario N6A5M1
519-850-3335

Vacuna contra la pulmonía neumococa

¿Qué es la vacuna contra la pulmonía neumococa?

La vacuna contra la pulmonía neumococa lo protege contra un tipo de bacteria que normalmente causan pulmonía. Pulmonía es un término que se utiliza para describir varias enfermedades que causan una inflamación o infección en los pulmones. La bacteria *Streptococcus pneumoniae* causa el tipo de pulmonía llamada pulmonía neumococa (también llamada pulmonía estreptococa). La bacteria también puede causar bacteriemia (infección de la sangre), meningitis (infección del revestimiento del cerebro y de la médula espinal) y otras infecciones.

¿Por qué algunas personas se deberían dar esta vacuna?

La pulmonía neumococa es el tipo más común de pulmonía. Puede ocurrir después de una infección de las vías respiratorias superiores, como un resfrío o la gripe, sobre todo si tiene una enfermedad crónica o más de 65 años de edad. Afecta a casi 500,000 norteamericanos todos los años. Más de 40,000 personas mueren de pulmonía todos los años. El riesgo de tener una pulmonía aumenta después de los 40 años de edad, y se duplica después de los 60. Esta vacuna no lo puede proteger contra todos los tipos de pulmonía, pero puede prevenir la forma más común.

¿Quién se debe dar la vacuna?

Su profesional médico le podrá recomendar que se dé la vacuna si:

- Tiene 65 años de edad o más.
- Va a tener un tratamiento con quimioterapia (dése la vacuna por lo menos 2 semanas antes de que comience la quimioterapia).
- Tiene diabetes, enfermedad del corazón, enfermedad crónica del pulmón, enfermedad de los riñones o enfermedad del hígado.
- Tiene leucemia, enfermedad de Hodgkin, mieloma múltiple o linfoma.
- Es alcohólico.
- Tiene VIH/SIDA, un órgano trasplantado u otra condición que ha debilitado su sistema inmunológico.
- Tiene la enfermedad de células falciformes.
- Le han quitado el bazo.

No se debe dar más de 2 vacunas contra la pulmonía en toda su vida. Una vacuna se tiene que dar por lo menos 5 años más tarde que la otra.

No se dé la vacuna si:

- tiene una infección actualmente (espere a que desaparezcan los síntomas de la infección)
- es alérgico a timerosal (thimerosal, un preservativo fabricado con mercurio)
- tuvo una reacción alérgica a la vacuna en el pasado.

Si cree ser alérgico a los huevos, consulte con su profesional médico antes de darse la vacuna.

¿La vacuna causa efectos secundarios?

Después de darse la vacuna, la zona donde se la aplicó puede quedar enrojecida y dolerle (una reacción local leve). Raramente (en menos del 1% de los casos) tendrá fiebre, dolor muscular o reacciones locales severas. No se puede contagiar una infección neumococa por darse la vacuna.

¿Qué más tengo que saber sobre esta vacuna?

- El costo de la vacuna está cubierto por Medicare y la mayoría de las compañías de seguro estatales de Medicaid. Es posible que también esté cubierto por su seguro de salud privado, dependiendo de la razón por la que se la quiera dar. Consulte con su compañía de seguros.
- Puede darse la vacuna en el consultorio del médico o en la mayoría de los departamentos locales de salud pública.
- Puede darse las vacunas contra la gripe y contra la pulmonía neumococa al mismo tiempo sin aumentar sus efectos secundarios.
- Pregúntele a su profesional médico qué otras vacunas se debería dar.
- Para obtener más información, póngase en contacto con: National Coalition for Adult Immunization
4733 Bethesda Avenue, Suite 750
Bethesda, MD 20814
301-656-0003 American Lung Association
1740 Broadway
New York, NY 10019-4374
800-586-4872
Sitio Web: <http://www.lungusa.org> ▶▶

También puede obtener información poniéndose en contacto con el departamento de salud pública de su zona.

Published by McKesson Provider Technologies.

Este material se revisa periódicamente y está sujeto a cambios en la medida que aparezca nueva información médica. Se proporciona sólo para fines informativos y educativos, y no pretende reemplazar la evaluación, consejo, diagnóstico o tratamiento médico proporcionados por su profesional de atención de la salud.

Escrito por Carolyn Norrgard, RNC, BA, MEd, y Carol Matheis-Kraft, PhD, RNC, para McKesson Provider Technologies.

Copyright © 2005 McKesson Corporation and/or one of its subsidiaries. All Rights Reserved.

Special Instructions:

Copyright © Clinical Reference Systems 2006
Adult Health Advisor